

Mourisco de Semente

Vass7R03s356-360



INRA  
SCIENCE & TERRITORY

Collection Vassal-Montpellier

1502Mtp2

*Vass7R03s356-360  
Mourisco de Semente*

*Mourisco de Semente n  
7 R 3 s 356. 360*























ANNEE 1991

NOM Mauricio de Semente EMPLACEMENT 7 R 3 A 356.360

1502 02

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      |           |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 2      | f         |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 3      |           |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      | f         |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      | 2         | 21.3         | 2.4    | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : erg Vigueur : 1

21.3 2.4 0  
21.3 2.4 91  
+15

ANNEE 1992 Douro

NOM Mauricio de Semente EMPLACEMENT 7 R 3 A 356.360

150202

| Souche | Nbre yeux | Débourrement |        | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|        |           | début        | mi/déb |           |            | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1      |           |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 2      | f         |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 3      | f         |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 4      | f         |              |        |           |            |           |      |     |          |      |     |          |
| 5      | 2         | 16.3         | 23.3   | 0         |            |           |      |     |          |      |     |          |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :

16.3 23.3 0  
16.3 23.3 92  
+3



ANNEE: 1995

NCM Mourisco de semente

## EMPLACEMENT

7R3A356.360

1502.02

| ouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |              | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité   | Floraison |      |     | Véraison |      |      | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
|       |              | début        | mi/déb       |              |  | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin  |          |
| ✓ 1   |              |              |              |              | 67   | 1.6       | 3.6  | 7.6 | 24.7     | 7.8  | 10.8 | 4.9      |
| 2     | 1            |              |              |              |  |           | +6   |     |          | +3   |      | +3       |
| 3     | 6            | 27.3         | 3.4          | 4            | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C<br><u>Pour</u> : <u>Mill</u> :<br><u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :<br>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus<br><u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré<br><u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb<br><u>Pépins</u> : avec - apyrène<br><u>Port</u> : ring <u>Vigueur</u> : 2,5 |           |      |     |          |      |      |          |
| ✓ 5   | 6            |              |              | 4            |  |           |      |     |          |      |      |          |
|       |              | De           | 3.4.35 (+17) |              |  |           |      |     |          |      |      |          |



N° d'ordre :

Mourisco de semente

Désignation :

Emplacement :

7 R 3 A - 356-360 (4.2)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205<sup>1e</sup> - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212<sup>jaune</sup> - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2<sup>ème</sup> et de la 3<sup>ème</sup> feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Mourisco de semente

FR 30-356-360 (s. 2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sêteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. <sup>base</sup>

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88



N° d'ordre :

Mourisco de semente

Désignation :

Emplacement :

7 R 3 A - 356-360 (a.2)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétioilaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - <sup>ou lig. au point pétioilaire</sup> point pétioilaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - <sup>ou lig.</sup> duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo88



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Mourisco de semente

7 R 3 - 356 - 360 (n. 1)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 18 x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 88



Formulaire de description 6/8  
(après chute des feuilles)

Année 2003

Code cepage 1502

Code clone 02

Observateur T D

Nom cepage Mourisco de semente noir

Emplacement : 7 R3 3356-350

2004

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 2 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 60

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9. 6

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3



N° d'ordre :

Désignation : *Maurisco de Semente*

Emplacement : *7 R 31 356.360*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L<sub>1</sub> : 7 - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - (58) - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtus - moyennes - aigües